

# CONTROL Y PREVENCIÓN

Productos para el control y prevención de plagas

20  
25  
CATÁLOGO



 Arrela



## Comprometidos con el crecimiento.

En Arrela creemos en una conexión profunda con la tierra, en la responsabilidad de cuidar cada rincón verde para un futuro más sostenible.

No somos solo un recurso; somos el apoyo constante y la comunidad que acompaña a cada jardinero, desde quienes llevan años en el oficio hasta quienes inician con entusiasmo, compartiendo conocimiento y dedicación.

Honramos la jardinería como un arte de precisión y esfuerzo, valorando el compromiso de quienes transforman cada espacio en vida.

 **Arrela**

Contacta con nosotros y descubre las ofertas exclusivas para profesionales



[comanda@espaiarrela.com](mailto:comanda@espaiarrela.com)



# 01

## Fitosanitarios y Productos Ecológicos

Pág. 04



# 02

## Abonos, Fertilizantes y Bioestimulantes

Pág. 12



# 03

## Control Biológico y manejo de Plagas

Pág. 22



# Fitosanitarios y Productos Ecológicos



# 01



**PG FUNGI SIS ALIETTE WG**  
45g / 500g



**SJ LEICITOR WG fosetil**  
40g / 500g

## Datos técnicos (ambos productos)

### DOSIS

- 45g/15L de Caldo en Pulverización Plantas.
- 1-25 g/árbol (max 2 aplicaciones por campaña) contra Gomosis.
- 10 g/1m<sup>2</sup> en riego contra Fitophtora (plantas y árboles).
- 45g/3L para 30 m<sup>2</sup> en pulverización para césped contra Fitophtora y pitium (césped o prados).

### USO

Contra Fitophtora, Mildiu, Gomosis, Aguado y Pitium.

### TIPO DE PRODUCTO

Sistémico. Es absorbido por las hojas y raíces, distribuyéndose por toda la planta.

### PRODUCTOS NO COMPATIBLES

No mezclar con productos que contengan cobre, ya que puede reducir su eficacia. Evitar combinaciones con productos muy ácidos o alcalinos.



**SJ DOMARK EVO**  
**Antioidio JED**

15ml



**DOSIS**

Envase de 15 ml (dosis para 2 mochilas).  
Tetraconazol 12,5 % p/v (125 g/l).  
0,4 ml/l de agua en pulverización normal.

**USO**

Prevención y erradicación del Oidio, Oidiopsis y Moteado.

**TIPO DE PRODUCTO**

Sistémico. Penetra en los tejidos y se transporta dentro de la planta.

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**

Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas, pero no debe mezclarse con productos altamente alcalinos.

**SJ DRYCOP 50 DF**  
**Fung Prev JED**

5x60g / 500g



**DOSIS**

INVIERNO: 8 g/l de agua en pulverización normal.  
PRIMAVERA: 4g/l de agua en pulverización normal.

**USO**

Contra Mildiu - Ascochytois; Alternaria - Bacteriosis; Cribado - Monilia; Abolladura

**TIPO DE PRODUCTO**

Fungicida de contacto y preventivo. Forma una película protectora en la superficie de la planta, impidiendo la germinación de esporas.

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**

No mezclar con productos ácidos (como fosetil-aluminio) ni con aceites minerales.



**SJ AZUFRE 80 WG  
JED**

50g / 500g



**DOSIS**

2-5 g/l.

**USO**

Contra Oidio, Araña Roja, Ácaros, Oidiopsis, Mildiu, Eriofidos, Acaro de las maravillas, Negrilla y Eriosis.

**TIPO DE PRODUCTO**

Fungicida de contacto y preventivo.

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**

No mezclar con aceites minerales, especialmente si han sido aplicados recientemente (esperar 2-3 semanas).

No aplicar en condiciones de alta temperatura (>30°C).

**SJ ZOLFE  
Fung. Sist. Poliv. JED**

5ml / 20ml



**DOSIS**

5 ml (Dosis Mochila 15 L)  
Difenoconazol 25%

**USO**

Contra Abolladura, Cribado, Monilia, Oidio, Septoria, Alternaria, Mancha Purpura, Roya, Stemfilium, Antracnosis, Ramularia, Micosfaerella

**TIPO DE PRODUCTO**

Sistémico y de contacto. Controla diversas enfermedades fúngicas.

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**

Revisa la etiqueta para confirmar compatibilidad con aceites o productos específicos.

## SJ PACK FRUTALES JED



### DOSIS

INVIERNO: 8 g/l de agua en pulverización normal.  
PRIMAVERA: 4g/l de agua en pulverización normal.  
(Cobre), (Fosdan) y (Citrolina)

### USO

Contra araña roja, mosca blanca, pulgones, cochinillas y preventivo de hongos.

### TIPO DE PRODUCTO

Fungicida + Aceite + Insecticida

### PRODUCTOS NO COMPATIBLES

Consulta las especificaciones en el envase del producto.

## SJ MASTER Pasta cicatrizante JED 1Kg



### DOSIS

55% Resina, 45% Aceite Vegetal, Sustancias Cicatrizantes, etc.

### USO

Para heridas e injertos.

### TIPO DE PRODUCTO

Fungicida protector de contacto. Forma una barrera física para prevenir infecciones en heridas de poda o daños.

### PRODUCTOS NO COMPATIBLES

No se mezcla con otros productos; se aplica directamente.



**PH INSECT.  
RASTREROS JED**

500ml



**DOSIS**

Consulta las especificaciones en el envase del producto.

**USO**

Contra cucarachas, hormigas y todo tipo de insectos rastreros (pulgas, pececillos de plata, chinches, escarabajos, arañas, etc).

**TIPO DE PRODUCTO**

Insecticida de contacto y estomacal. Actúa rápidamente sobre insectos rastreros.

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**

Compatible con la mayoría de productos, pero evita mezclas con fungicidas cúpricos o aceites minerales.

**SJ INSECT.  
RAST. AVIDUST JED**

1Kg



**DOSIS**

Aplicar a razón de 1kg de producto por cada 15-25 m<sup>2</sup> de superficie aproximadamente.

**USO**

Contra moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas y demás insectos voladores y rastreros

**TIPO DE PRODUCTO**

Insecticida de contacto y estomacal. Actúa rápidamente sobre insectos rastreros.

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**

Compatible con la mayoría de productos, pero evita mezclas con fungicidas cúpricos o aceites minerales.

**SJ EPINSEL**  
**Inst. systemic JED**  
 25/100/50/500ml



**DOSIS**  
 4-5 ml/l.  
 Acetamiprid 0,5%

**USO**  
 Control de cochinillas, pulgones, mosca blanca, escarabajo de la patata y minadores.

**TIPO DE PRODUCTO**  
 Insecticida sistémico. Penetra en la planta y actúa contra plagas chupadoras.

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**  
 Evita mezclas con productos de reacción alcalina o aceites.

**SJ CITROLINA**  
**Aceite Insec.**  
 100ml



**DOSIS**  
 Pulverizar abundantemente con una disolución de 10-15ml/l de agua. Aceite de parafina 79%.

**USO**  
 Para combatir plagas de cochinilla, mosca blanca o araña roja.

**TIPO DE PRODUCTO**  
 De contacto. Asfixia a las plagas

**PRODUCTOS NO COMPATIBLES**  
 No mezclar con azufre ni aplicar si este ha sido usado recientemente.

\*Muy recomendable mezclar con otros insecticidas para mejorar el efecto durante el invierno.



## SJ ANTICOCHINILLA JED

10ml / 100ml



### DOSIS

0,25-0,75 ml/L  
Piriproxifen 10%

### USO

Para control de plagas de Cochinillas en diferentes cultivos.

### TIPO DE PRODUCTO

Controla cochinillas mediante contacto y acción sistémica

### PRODUCTOS NO COMPATIBLES

Compatible con la mayoría de productos.

## PR JABON NATURE (Jabon Fosforico)

500ml



### DOSIS

La dosis recomendada es de 0,15 a 0,30 ml/L

### USO

Para eliminar plagas de mosca blanca, cochinillas, trips y pulgón. También actúa como potenciador de insecticidas.

### TIPO DE PRODUCTO

Insecticida y fungicida de contacto.

### PRODUCTOS NO COMPATIBLES

Compatible con aceites e insecticidas, pero no debe mezclarse con productos sistémicos o muy ácidos.



# Abonos, Fertilizantes y Bioestimulantes



# 02

**VEGEVERT SDR BASE Pulgran 25 Kg**  
Organico, alto rendimiento Humus y enraizante

**DOSIFICACIÓN**  
20-40 g/m<sup>2</sup>

**FRECUENCIA**  
Aplicar cada 6-8 semanas durante la temporada de crecimiento activo.

**MODO DE USO**  
Distribuir de manera uniforme en césped o cultivo.  
Regar abundantemente después de la aplicación.



**EVER 7 SDR 7.4.7+2 Pulgran 25 Kg**  
100% Organico duración de 1 mes aprox.

**DOSIFICACIÓN**  
25-50 g/m<sup>2</sup>.

**FRECUENCIA**  
Aplicar al inicio del crecimiento activo y repetir cada 8 semanas.

**MODO DE USO**  
Esparcir uniformemente sobre el área deseada y regar después.



**SPRINTOR SDR 11-5-11 SK +2 Pulgran 25 Kg**

Abono orgánico y mineral duración 2 meses aprox.

**DOSIFICACIÓN**

30-60 g/m<sup>2</sup>.

**FRECUENCIA**

Cada 6-8 semanas en céspedes de alto rendimiento.

**MODO DE USO**

Aplicar sobre césped seco y regar profundamente.



**GREENPLUS MINI 17-5-15+ 2 Mg 25 kg**

Abono mineral duración 3 meses aprox.

**DOSIFICACIÓN**

20-50 g/m<sup>2</sup>.

**FRECUENCIA**

Cada 6 semanas durante el periodo de crecimiento activo.

**MODO DE USO**

Espolvorear sobre el césped o suelo, seguido de riego.



### YARAMILA Complex 12.11.18+20SO3+3MgO 25 Kg

Abono mineral liberación rápida

#### DOSIFICACIÓN

30-70 g/m<sup>2</sup>.

#### FRECUENCIA

Aplicar cada 4-6 semanas según las necesidades del cultivo o césped.

#### MODO DE USO

Mezclar con el suelo o aplicar en superficie y regar después.



### SULFATO AMÓNICO 21N+58 SO3 GR 25 Kg

Fertilizante Ultrarapido

#### DOSIFICACIÓN

20-30 g/m<sup>2</sup>.

#### FRECUENCIA

Aplicar en primavera y otoño.

#### MODO DE USO

Distribuir uniformemente en suelo húmedo y regar abundantemente. Mantener excesivamente hidratado durante la aplicación del producto para diluirlo.



## SULFATO DE HIERRO GR.12% Fe 25 kg

Sin magnesio

### DOSIFICACIÓN

10-20 g/m<sup>2</sup>.

### FRECUENCIA

Aplicar 2-3 veces al año para corregir deficiencias de hierro.

### MODO DE USO

Esparcir sobre el césped y regar para evitar manchas.



## NUTRIKALI 5l

Abono organico folear ultra rapido

### DOSIFICACIÓN

200-300 ml/100 l de agua.

### FRECUENCIA:

Aplicar cada 2-3 semanas durante la temporada activa.

### MODO DE USO

Diluir en agua y aplicar mediante riego o pulverización.



### TH PROMOTOR 500g

Trichoderma harzianum (1x10<sup>9</sup> UFC/g) + 30% aminoácidos

#### DOSIFICACIÓN


2-3 g/l de agua.

#### FRECUENCIA

Usar cada 15-20 días para promover el desarrollo radicular.

#### MODO DE USO

Diluir en agua y aplicar al suelo o mediante riego.



### EVERGREEN VIVA TURF PAINT 9,5l

Colorante para césped

#### DOSIFICACIÓN

200-400 ml/100 m<sup>2</sup>.

#### FRECUENCIA

Según necesidad estética o funcional.

#### MODO DE USO

Diluir según las instrucciones y aplicar con pulverizador.



### SACO RHIZOVIT PROCESS 3 25Kg

Estimulan la actividad bacteriana, activa el suelo y la raíz

#### DOSIFICACIÓN

25-50 g/m<sup>2</sup>.

#### FRECUENCIA

Cada 8 semanas, dependiendo del tipo de suelo.

#### MODO DE USO

Aplicar uniformemente y regar.



### SACO MULTIGREEN CLASSIC 25Kg

Para cultivos generales, céspedes, huertos y jardines, proporcionando nutrientes esenciales para un crecimiento saludable y balanceado.

#### DOSIFICACIÓN

20-40 g/m<sup>2</sup>.

#### FRECUENCIA

Cada 6-8 semanas

#### MODO DE USO

Esparcir sobre el césped o cultivo y regar después.



### SACO MULTIGREEN SOMERO 25 Kg

Ideal para cultivos de alto rendimiento, céspedes y plantas ornamentales, proporcionando un balance óptimo para vigor y productividad.

#### DOSIFICACIÓN

25-50 g/m<sup>2</sup>.

#### FRECUENCIA

Cada 6 semanas durante el verano.

#### MODO DE USO

Aplicar directamente y regar para una mejor absorción.



### VG.QUELATO DE HIERRO 500g

Corrector de carencia en la clorofila de la hoja

#### DOSIFICACIÓN

2-4 g/l de agua.

#### FRECUENCIA

Cada 15 días en caso de deficiencias.

#### MODO DE USO

Aplicar vía foliar o al suelo diluido en agua.



### VG. ABONO CESPED NP 11-49 800g

#### DOSIFICACIÓN

10-15 g/m<sup>2</sup>

#### FRECUENCIA

Usar al momento de sembrar o trasplantar césped.

#### MODO DE USO

Incorporar al suelo y regar.



### VG. ABONO CITRICOS 21-6-9 750g

#### DOSIFICACIÓN

50-100 g por árbol.

#### FRECUENCIA

Cada 3 meses durante el crecimiento activo.

#### MODO DE USO

Distribuir alrededor del tronco y regar.



### VG. ABONO HUERTA FRUTALES 1kg

#### DOSIFICACIÓN

100-200 g por planta.

#### FRECUENCIA

Cada 2 meses durante la temporada de crecimiento.

#### MODO DE USO

Esparcir alrededor de la planta y regar.



### VG ABONO UNIVERSAL 1Kg

#### DOSIFICACIÓN

20-50 g/m<sup>2</sup>.

#### FRECUENCIA

Cada 4-6 semanas.

#### MODO DE USO

Aplicar al suelo y regar para activar los nutrientes.





Control Biológico y  
Manejo de Plagas



03



### **APHIDALIA 100 LARVES**

#### **ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Primavera-verano (según presencia de pulgones)

#### **DOSIFICACIÓN**

5-10 larvas/m<sup>2</sup>

#### **USO CONTRA**

Pulgones (Aphididae)



### **APHIPAR 500**

#### **ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Todo el año (en invernadero o climas cálidos)

#### **DOSIFICACIÓN**

1-5 individuos/m<sup>2</sup>, según nivel de infestación.

#### **USO CONTRA**

Pulgones (Aphididae)



### **CRYPTOBUG 500 adultos**

#### **ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Primavera-verano

#### **DOSIFICACIÓN**

1-2 individuos/m<sup>2</sup>

#### **USO CONTRA**

Cochinillas (Pseudococcidae)



### SWIRSKI-MITE Ultimate

250u de 100/500 sobres

#### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Todo el año (en cultivos protegidos).

Se aplica desde la primavera (marzo-abril) hasta el otoño temprano (septiembre-octubre). (En cultivos no protegidos)

#### DOSIFICACIÓN

1 sobre por planta o por cada 2-4 m<sup>2</sup>

#### USO CONTRA

Trips (Frankliniella spp.), ácaros blancos (Polyphagotarsonemus latus) y mosca blanca (Bemisia tabaci)



### CAPSANEM 2X25 Millones

2x25 / 2x50 Millones

#### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Primavera-verano (temperaturas del suelo entre 12-30°C)

#### DOSIFICACIÓN

1 millón de nematodos/m<sup>2</sup> o según etiqueta

#### USO CONTRA

Larvas del gusano del suelo, escarabajos (como Otiorhynchus spp.) y orugas



### TRAMPA PICUSAN (morrut) SANSAN

#### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Todo el año (especialmente primavera y otoño, cuando aumenta la actividad del picudo)

#### DOSIFICACIÓN

1 trampa por 1-2 hectáreas

#### USO CONTRA

Picudo rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*)



### FERO.PHEROSAN (2u.)

#### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Todo el año, combinado con trampas.

#### DOSIFICACIÓN

1 feromona/trampa (reemplazar cada 6-8 semanas).

#### USO CONTRA

Picudo rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*)



### TRAMPA Procecionaria

#### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Verano (captura de adultos) y finales de otoño/ invierno (procesionaria activa)

#### DOSIFICACIÓN

1 trampa cada 5-10 árboles

#### USO CONTRA

Procecionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)



## FEROMONA PROCESIONARIA

1mg (200 días)

### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Verano (uso con trampas)

### DOSIFICACIÓN

1 cápsula por trampa (duración de 200 días)

### USO CONTRA

Procesionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)



## PROCESSATRAP COLLAR

110cm

### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Invierno (cuando las orugas descienden del árbol)

### DOSIFICACIÓN

1 collar por árbol afectado

### USO CONTRA

Procesionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)



## LARVANEM

50/500 Millones

### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Primavera y otoño (cuando las temperaturas del suelo son de 12-30°C)

### DOSIFICACIÓN

Para infestaciones moderadas: 2-4 millones de nematodos/m<sup>2</sup>.

Para infestaciones altas: hasta 8 millones de nematodos/m<sup>2</sup>.

### USO CONTRA

Gusanos del suelo, larvas de escarabajos y orugas (específicamente larvas de escarabajos de la familia Scarabaeidae).



## PALMANEM

50/500 Millones

### ÉPOCA DE APLICACIÓN

Primavera, verano y otoño, cuando la temperatura del suelo oscila entre los 15-30°C

### DOSIFICACIÓN

Se recomienda aplicar 2-4 millones de nematodos/m<sup>2</sup> en suelos con plagas activas.

En condiciones de alta infestación, se puede aumentar la dosis

### USO CONTRA

Gusano gris (larvas de *Agrotis* spp.), escarabajos y orugas que se desarrollan en el suelo



# Condiciones Generales de Venta

## INFORMACION SOBRE PRECIOS Y REPARTO

### PRECIOS

Todos los precios que aparecen en este catálogo son orientativos. Los precios no incluyen IVA.

### REPARTO

En caso de necesitar servicio de reparto, este se facturará por separado.

## CONDICIONES DE DESCUENTOS

Los descuentos solo se aplican a profesionales de la jardinería o sectores similares que estén dados de alta y cuenten con registro mercantil inscrito.

## CONDICIONES DE PAGO Y PEDIDOS

### PRIMER PEDIDO

El pago deberá realizarse al contado o mediante transferencia previa como condición para la aceptación del pedido.

### RECLAMACIONES

Las reclamaciones deben ser formuladas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del material.

No se aceptarán reclamaciones por pequeñas diferencias de color en productos naturales.

### Devoluciones

No se admiten devoluciones bajo ninguna circunstancia.

## INCUMPLIMIENTOS Y CONDICIONES ESPECIALES

Todos los vencimientos están asegurados por Crédito y Caucción y/u otras entidades de crédito. En caso de incumplimiento de pago, estas entidades podrán actuar judicialmente para el cobro.

En situaciones de fuerza mayor que dificulten la fabricación o entrega, Arrela se reserva el derecho de retrasar los pedidos. Si estas causas persisten por más de un mes, los pedidos podrán ser cancelados sin obligación de indemnización.

Causas consideradas de fuerza mayor incluyen: huelgas, falta de transporte, accidentes, incendios, y cualquier circunstancia fuera del control del vendedor.

## ACEPTACION DE CONDICIONES

El hecho de realizar un pedido a Arrela implica el conocimiento y aceptación por parte del comprador de estas condiciones generales de venta.





COMANDA ONLINE PARA PROFESIONALES  
comanda@espaiarrela.com

# Arrela



Polígono Industrial (PAEC)  
Carrer de la Verema, 7  
17251 (Calonge)

[www.espaiarrela.com](http://www.espaiarrela.com)  
+34 634 370 268





COMANDA ONLINE PARA PROFESIONALES  
[comanda@espaiarrela.com](mailto:comanda@espaiarrela.com)



Polígono Industrial (PAEC)  
Carrer de la Verema, 7  
17251 (Calonge)

[www.espaiarrela.com](http://www.espaiarrela.com)  
+34 634 370 268